新型コロナウイルス ワクチン接種のお知らせ



オミクロン株に対応した2価ワクチンの接種が受けられます

現在、市では、オミクロン株に対応した2価ワクチンの接種を進めています。接種の対象となる方へ接種券などをお届けしています。新型コロナはこれまでの2年間、年末年始に流行しています。感染再拡大の前に、接種のご検討をお願いします。

接種対象者

- ○新型コロナの従来株とオミクロン株に対応したワクチン(オミクロン株対応 2 価ワクチン)の接種は、 初回(1・2 回目)接種を完了した 12 歳以上の全ての方が対象で、一人 1 回接種できます。
- ○初回接種を完了した 12 歳以上で、前回の接種から 5 か月*以上経過している方は接種可能です。 接種済み回数に応じたお手元の接種券を使用してください。
- ※現在、国において接種間隔の短縮等を検討しており、10月下旬までに結論が出る予定です。

使用するワクチン

オミクロン株対応2価ワクチン	1・2回目接種対象者	3□目	以降の接種対象	者
ファイザー社ワクチン	່ ★ (使用不可)	12歳以上	12歳以上	18歳以上
			0	0
モデルナ社ワクチン	💢 (使用不可)	18歳以上	×	0

※オミクロン株対応2価ワクチンは、11歳以下は接種対象となりません。

オミクロン株対応2価ワクチンの効果

■ 従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待されています。

オミクロン株対応ワクチンの追加接種には、オミクロン株の成分が含まれるため、従来型ワクチンと比較した場合、オミクロン株に対する免疫をより強く誘導することから、オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、持続期間が短い可能性があるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されています。

■ 2 価のワクチンであることにより、さまざまな新型コロナウイルスに反応します

異なる2種類の抗原があることにより、誘導される免疫も、より多様な新型コロナウイルスに反応 すると考えられ、<mark>今後の変異株に対して有効である可能性</mark>がより高いことが期待されています。

オミクロン株対応2価ワクチンの副反応

ファイザー社およびモデルナ社の 2 価ワクチンの薬事承認において、**どちらのワクチンも従来型ワクチンとおおむね同様の症状が見られました。**

〈接種後7日間に現れた症状〉

炎田베스	症状		
発現割合	ファイザー社	モデルナ社	
50%以上	注射部位疼痛	注射部位疼痛、疲労	
10~50%	疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛	頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、悪寒、悪心・嘔吐	
1~10%	下痢、発赤、腫脹、発熱、嘔吐	紅斑·発赤、腫脹·硬結、発熱	

圓新型コロナワクチン対策室 Д0297(21)7111

出典:厚生労働省資料